

---

### 【第1問】症状の理解（基礎）

統合失調症の陽性症状はどれか。

1. 感情鈍麻
2. 自閉
3. 幻聴
4. 意欲低下

<details> <summary>▶ 正解・解説</summary>

正解：3

- 陽性症状：幻覚・妄想
- 1・2・4 は陰性症状

👉 国試頻出の基本問題

</details>

---

### 【第2問】コミュニケーション（最重要）

幻聴のある統合失調症患者が

「誰かに監視されている」と訴えている。

看護師の対応で最も適切なのはどれか。

1. 「そのような事実はありません」
2. 「誰が監視していると思いますか」
3. 「不安を感じているのですね」
4. 「考えないようにしましょう」

<details> <summary>▶ 正解・解説</summary>

正解：3

- 妄想の内容は肯定しない
- 感情（不安）には共感する

✖ 2 は妄想を強化する

</details>

---

### 【第3問】急性期看護

急性期の統合失調症患者への看護で最優先されるのはどれか。

1. 現実検討能力の回復
2. 社会生活技能訓練
3. 患者の安全確保
4. 退院支援の開始

<details> <summary>▶ 正解・解説</summary>

正解：3

- 急性期＝幻覚・興奮 → 安全最優先
- SST や退院支援は回復期以降

</details>

---

#### 【第 4 問】薬物療法

抗精神病薬の副作用で錐体外路症状に該当するのはどれか。

1. 口渴
2. 体重増加
3. 振戦
4. 便秘

<details> <summary>▶ 正解・解説</summary>

正解：3

- 錐体外路症状：振戦・筋強剛・アカシジア
- 1・2・4 は自律神経系副作用

</details>

---

#### 【第 5 問】行動制限・倫理

統合失調症患者に隔離・拘束を行う目的で最も適切なのはどれか。

1. 治療効果を高めるため
2. 看護業務を円滑にするため
3. 患者および周囲の安全を確保するため
4. 患者の行動を矯正するため

<details> <summary>▶ 正解・解説</summary>

正解：3

- 行動制限の目的＝安全確保
- 儲・管理目的は NG

</details>

---

#### 【第 6 問】慢性期・社会復帰

慢性期の統合失調症患者への看護で最も適切なのはどれか。

1. 幻覚への現実検討を強化する
2. 服薬は患者の判断に任せる
3. 社会資源の活用を支援する
4. 症状が消失するまで入院を続ける

<details> <summary>▶ 正解・解説</summary>

**正解：3**

- 慢性期＝地域生活支援
- 完全治癒を目標にしない

</details>

---

**【第7問】ひっかけ問題（応用）**

統合失調症患者への対応で不適切なのはどれか。

1. 安心できる環境を整える
2. 幻覚の内容を詳しく訂正する
3. 短く具体的に説明する
4. 患者の不安に共感する

<details> <summary>▶ 正解・解説</summary>

**正解：2**

- 幻覚・妄想の訂正・論破は NG

</details>